



ASPECTOS LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DO REVERDO ALVEOLAR PÓS-EXDONTIA COM OBJETIVO REABILITADOR

¹Vanessa Maria Carvalho Lima; ¹Carlos Higor Mendonça Araújo;

²Jorge Francisco Fiamengui Filho

¹Discente do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão.

²Docente do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão.

Introdução: A reabsorção óssea que ocorre durante o reparo natural do alvéolo após a exodontia, pode levar ao comprometimento estético e funcional nas próteses convencionais ou implantossuportadas, devido às alterações verticais e horizontais que ocorrem tanto no tecido ósseo como no tecido mole, limitando o espaço disponível para a instalação de implantes em posição ideal, criando um desafio para a obtenção de uma restauração protética compatível com os dentes naturais. **Proposição:** Dessa forma, o objetivo deste estudo foi revisar e destacar os aspectos que devem ser levados em consideração para a manutenção do rebordo alveolar a fim de possibilitar a reabilitação oral. **Revisão de literatura:** A literatura relata que após a exodontia de um elemento dentário, transformações ocorrem no rebordo alveolar com frequente diminuição do tecido ósseo e gengival da área. Essas transformações, que ocorrem com maior intensidade nos três primeiros meses após a exodontia, são mais acentuadas na parede vestibular e no terço cervical do alveolo. **Considerações finais:** O presente estudo enaltece que a estética durante a instalação de implantes ou coroas provisórias, é largamente dependente da quantidade e qualidade do tecido periodontal circundante, e sugere alguns pontos devem ser observados previamente à uma correta indicação de diversos tipos de procedimentos reabilitadores.

Palavras-Chave: Preservação. Rebordo alveolar. Cirurgia oral.