



REMOÇÃO DE SIALOLITO GIGANTE EM DUCTO DE WHARTON: RELATO DE CASO

¹Ana Roberta de Almeida Cabral; ²Valthierre Nunes de Lima; ¹João Paulo Bonardi; ¹Leonardo de Freitas Silva; ³Sormani Bento Fernandes Queiroz

¹Discente do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão.

²Cirurgião-dentista, Faculdade Católica Rainha do Sertão.

³Docente do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão.

Introdução: A sialolitíase é uma condição clínica relativamente comum, caracterizada pela obstrução da glândula salivar ou de seu ducto excretor por um cálculo, o qual recebe a denominação de sialolito. **Proposição:** O presente artigo relata um caso raro de sialolito gigante situado na região anterior do ducto de Wharton, o qual foi removido cirurgicamente por via intraoral, através de incisão no soalho bucal. **Relato de caso:** Pode ocorrer em qualquer faixa etária, apresentando leve predileção pelo gênero masculino e afeta, principalmente, a glândula submandibular. O diagnóstico é realizado pela correlação entre achados clínicos e radiográficos, sendo as radiografias oclusal e panorâmica as mais adequadas para este fim. Os sialolitos geralmente apresentam tamanho menor que 1 cm, mas raramente podem medir mais que 1,5 cm, os quais são denominados de sialolitos gigantes. O tratamento instituído mostrou-se adequado visto que após 8 meses de acompanhamento, o paciente evoluiu de maneira satisfatória. **Considerações finais:** A presença de sialolitos gera obstrução do fluxo salivar gerando alterações nos ductos ou glândulas salivares que podem evoluir com dor inflamação e ou infecção, dessa forma deve-se removê-los o mais rápido possível.

Palavras-chave: Patologia. Sialolitíase. Cirurgia bucal.