



UTILIZAÇÃO DE ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIIS E GLICOCORTICOIDES COMO ANALGESIA PREEMPTIVA DE EXTRAÇÕES DE TERCEIROS MOLARES: REVISÃO DE LITERATURA

¹Felipe Evangelista Veríssimo; ¹Antônio Ylderlandio Batista Dos Santos; ¹Eduarda De Almeida Pinheiro; ¹Carlos Higor Mendonça Araújo; ²Diego Felipe Silveira Esses

¹Discente do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão.

²Docente do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão.

Introdução: A remoção de 3^o molares está associada a vários graus de dor pós-operatória, existindo várias opções de terapias medicamentosas deixando muitas vezes o dentista indeciso na escolha da medicação. Uma estratégia utilizada é a medicação preemptiva, caracterizada pela administração da droga antes do procedimento cirúrgico. Existem grupos de medicamentos de ações farmacológicas diferentes que podem ser prescritos no controle pós-operatório de exodontias, como os antiinflamatórios não esteroidais (AINES) e os glicocorticoides. **Proposição:** O objetivo é revisar a literatura, buscando conhecer a eficácia desses grupos farmacológicos quando administrados de forma preemptiva, discutindo qual grupo obtém melhores resultados na redução da dor, edema e trismo pós-operatório de extrações de 3^{os} molares. **Metodologia:** Foram analisados artigos das bases de dados: BVS, Lilacs, Medline, PubMed e Scielo, sendo encontrados 30 artigos do período de 2000 a 2015. **Revisão de literatura:** A analgesia preemptiva reduz ou impede a produção de mediadores químicos como a histamina, serotonina, prostaglandinas entre outros que estão diretamente relacionados com os processos algícos e inflamatórios. Vários AINES como o diclofenaco de sódio, etoricoxibe, ibuprofeno já foram testados com resultados satisfatórios. Os glicocorticoides, como a dexametasona e prednisona também foram eficazes na redução do desconforto pós-operatório, reduzindo consideravelmente a dor, edema e trismo. **Considerações finais:** Os dois grupos farmacológicos, portanto, podem ser administrados com segurança, onde os glicocorticoides se apresentaram mais efetivos e um melhor custo benefício que os AINES.

Palavras-Chave: Medicação. Cirurgia bucal. Terceiro molar.