

INCIDÊNCIA DE HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE ITATIRA NA 5ª (CRES) DE CANINDÉ-CE

Kaio Márcio Cavalcante Soares; Donato Mileno Barreira Filho

A hanseníase é uma doença milenar, que desde seus primórdios gera estigmas e preconceitos. Infectocontagiosa, tem progressão lenta, alta infectividade por ter como porta de entrada e eliminação as vias aéreas superiores, e baixa patogenicidade porque nem todos os indivíduos que entram em contato com o bacilo adoecem, cuja evolução depende da imunidade celular do indivíduo contra o bacilo *Mycobacterium leprae*. é altamente incapacitante e deformante, quando o diagnóstico, é realizado tardiamente, pois a predileção do bacilo é pela pele e nervos periféricos, tornando o seu diagnóstico simples. A hanseníase pode atingir pessoas de todas as idades, de todos os sexos, no entanto, raramente ocorre em crianças. Há uma incidência maior da doença nos homens do que nas mulheres, na maioria das regiões do mundo. Esta pesquisa teve caráter descritivo com abordagem quantitativa, bibliográfica e visou conhecer o perfil epidemiológico da hanseníase no município de Itatira-CE, microrregião de Canindé, na tentativa de identificar a população mais vulnerável à infecção através da análise dos dados obtidos e da literatura, levantando o número de casos de pacientes classificando os portadores segundo o sexo, faixa etária, raça/cor e tratamento.

Palavras-chave: Perfil Epidemiológico. Hanseníase. Microregião de Canindé.