

MÉTODOS PREVENTIVOS PARA HEMORRAGIA PÓS-PARTO POR ATONIA UTERINA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Salma Hakerna Alencar Coelho¹, Francisca Deiviane Lopes Rodrigues¹, Mikaela da Silva Lima¹, Liene Ribeiro de Lima²

¹Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA).
E-mail: salmahakerna@gmail.com; fdeivianelp@hotmail.com; mikaelasilvalima@hotmail.com

²Enfermeira. Docente do curso de Enfermagem do Centro Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA).

E-mail: lieninha@gmail.com

Introdução: umas das maiores causas de morbimortalidade materna no mundo é a Hemorragia Pós-Parto (HPP), causadora de 125.000 mortes por ano. As causas são diversas, dentre elas está a Atonia Uterina, a qual é responsável por 80% das mortes por HPP. A Atonia Uterina é a perda do tônus muscular uterino no período pós-parto e consequentemente ocasiona hemorragia uterina que leva ao choque hipovolêmico quando não assistida adequadamente. **Objetivo:** investigar através de uma revisão de literatura os meios de prevenção para Hemorragia Pós-Parto decorrente de uma Atonia Uterina. **Método:** Revisão bibliográfica realizada na base de dados científica do SciELO pelo cruzamento dos Descritores de Ciência em Saúde (DECS): Hemorragia Pós-Parto; Enfermagem e Saúde da Mulher. Os critérios de inclusão foram artigos científicos publicados no período de 2005 a 2019, ser completo, domínio público e língua portuguesa. No entanto, foram descartados os artigos com duplicidade. Foram encontrados 8 artigos, mas somente 2 artigos atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. **Resultados:** estudos mostram que mulheres que faz o uso de uterotônicos, como ocitocinas (10UI IM), ergonovina (0,2mg IM) ou misoprostol sublingual (200 a 1000 mcg) tendem a ter menos perda de sangue do que mulheres que não usam. Caso a hemorragia não cessar com os usos de fármacos é feita a identificação e a prevenção dos fatores de risco e diagnóstico, mas em casos mais graves são feitos métodos cirúrgicos. **Conclusão:** torna-se indispensável as medidas de prevenção de HPP para a equipe de saúde obstétrica, como a instalação de Procedimento Operacional Padrão a fim de prestar atendimento imediato às pacientes com HPP e assim reduzir as mortes maternas.

Descritores: Hemorragia Pós-Parto. Enfermagem. Saúde da Mulher.