

TAENIA SP.: IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO COMO FORMA DE PROFILAXIA

Sara Karine Martins Silva¹; Dalila Leite Saldanha¹; John Elvys Silva da Silveira¹; Marcella Saldanha de Sousa¹; Regilane Matos da Silva Prado²

¹Discente do curso de Farmácia do Centro Universitário Católica de Quixadá;
E-mail: sara.kariny@hotmail.com

²Docente do curso de Farmácia do Centro Universitário Católica de Quixadá;
E-mail: regimatosilva@unicatolicaquixada.edu.br

A teníase e a cisticercose são causadas pela mesma espécie de parasito, porém com fase de vida diferente, e em ambos os casos o homem é o hospedeiro definitivo. A cisticercose é uma parasitose provocada pela presença da larva de *Taenia sp.* nos tecidos bovinos, suínos ou do homem. Já a teníase é adquirida através do consumo de carne crua ou insuficientemente cozida contendo os cisticercos das mesmas. Mesmo a cisticercose sendo uma zoonose de grande impacto tanto para a saúde animal quanto para a saúde pública, ainda não se conhece a realidade epidemiológica da ocorrência dela. É também uma das infecções mais difundidas nos países em que há criação bovina e como o seu ciclo evolutivo passa pela teníase humana, a importância de que se reveste seu estudo abrange tanto a esfera da medicina veterinária quanto a da saúde pública. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é despertar a importância da higienização como uma forma de profilaxia para que diminua a incidência dessa doença. A parasitose pode causar desconforto abdominal, náuseas, vômitos, diarreia ou constipação, cólicas intestinais, alterações no apetite, além de mal-estar geral, indisposição, fadiga fácil e perda de peso. O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura efetuada nas bases de dados: LILACS, SCIELO, BVS, além de livros, impressos e formulários publicados pelo Ministério da Saúde. Para referida busca foi utilizado os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Cisticercose, Parasitologia, *Taenia saginata*, *Taenia solium* e Teníase. Os critérios de inclusão para essa busca são: publicações no período de 2008 a 2018, ser artigo completo e de domínio público na língua portuguesa e inglesa. Os artigos com duplicidade foram excluídos. Foram encontradas 12 publicações, somente 8 artigos atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Desses trabalhos pode-se observar que a falta de tratamento dos esgotos urbanos que poluem os mananciais aonde os animais irão se abastecer, além do frequente consumo e falta de inspeção da carne comercializada podem proporcionar um ambiente favorável ao surgimento da teníase e cisticercose. Por conseguinte, evidencia-se que a prevalência em humanos é susceptível de ser reduzida por meio de medidas sanitárias voltadas ao abate e comercialização da carne e de desenvolvimento de hábitos e práticas alimentares adequados, tais como: educação sanitária, detecção e tratamento do indivíduo parasitado, uso de instalações sanitárias com fossas ou redes de esgotos e inspeção sanitária. Medidas epidemiológicas também podem ser adotadas, como: esclarecer a população sobre os riscos e combater a prática do abate clandestino dos bovinos e garantir esterilização parasitária das águas.

Palavras-chave: Cisticercose. Parasitologia. *Taenia saginata*. *Taenia solium*. Teníase.